

مدت ایستگاه: ۵ دقیقه

حیطه مربوطه: مهارت عملی احیاء قلبی عروقی (دیفبریلاسیون)



غیر حیاتی



نوع سوال: حیاتی *

تنه سوال (Stem)

آقای ۵۴ ساله ای با درد خرد کننده قفسه سینه و استفراغ به اورژانس مراجعه می کند. شما اقدام به رگ گیری، تجویز آسپیرین، مانیتورینگ قلبی و انتقال تراسی احیا بالای سر بیمار می کنید. در حین رگ گیری ناگهان بیمار هوشیاری خود را از دست داده و مانیتورینگ قلبی بیمار به شکل زیر می شود. اولین اقدام مناسب است؟ اقداماتی را که انجام می دهید شرح دهید و بر روی مولژ انجام دهید.



چک لیست "Checklist"

ردیف	سوالات	معیار	عملکرد
۱	توضیح می دهد که با توجه به ریتم و در دسترس بودن تراسی احیا اولین اقدام دیفبریلاسیون است	۳	
۲	دستگاه DC Shock را روشن می کند.	۱	
۳	۲۰۰ ژول انرژی را انتخاب می کند	۲	
۴	مد Asynchronous را انتخاب می کند	۲	
۵	دستگاه را شارژ می کند	۱	
۶	پدله را به راحتی از دستگاه جدا می کند	۲	
۷	از ژل لوبریکنت روی پدله استفاده می کند	۲	
۸	پدله را در محل درست روی سینه بیمار قرا می دهد	۲	
۹	دکمه تخلیه انرژی را می شناسد	۱	
۱۰	بلافاصله بعد از انجام شوک ماساژ قلبی را شروع می کند	۲	
۱۱	توضیح می دهد که بعد از یک سیکل احیا نبض مرکزی (کاروتید) بیمار را چک می کند	۲	
	جمع	۲۰	

تجهیزات تخصصی مورد نیاز:

میز

مولژ احیای بالغین

دستگاه Biphasic DC Shock

ژل لوبریکنت

دستمال کاغذی ۱ بسته

لطفا راهنمای ممتحن در این قسمت نوشته شود:

در صورتی که آزمون دهنده آیتم ۱ را اشتباه پاسخ داد، مستقیماً به سمت انجام DC Shock راهنمایی شود.
آیتم ۹ تخلیه انرژی فقط توضیح داده شود و انجام نشود.
بعد از انجام دفیبریلاسیون در مورد اقدام بعدی سوال شود. نیاز به انجام ماساژ نیست.
آزمون دهنده در زمان انجام احیا تا این مرحله فرد کمکی ندارد